



محتوی الجرعة المعززة



واکسن‌های یادآور: واکسن یادآور چیست؟

واکسن یادآور به معنای تزریق 1 دوز اضافی واکسن است. این دوز به تقویت پاسخ ایمنی کمک می‌کند و مدت زمان ایمنی بدن را در مقابل ابتلا به نوع شدید COVID-19 افزایش می‌دهد.

واکسن‌های یادآور: اگر 2 دوز واکسن را تزریق کرده باشم و به COVID-19 مبتلا شده باشم، آیا همچنان به دوز یادآور نیاز دارم؟

بله. ابتلا به بیماری تا حدی موجب ایمنی می‌شود اما واکسیناسیون به تقویت پاسخ ایمنی کمک می‌کند و قدرت و مدت زمان ایمنی بدن را افزایش می‌دهد.

با توجه به توصیه کمیته مشورتی ملی درباره واکسیناسیون (National Advisory Committee on Immunization) افراد باید 3 ماه بعد از ابتلا به COVID-19 یا حداقل 6 ماه بعد از تزریق آخرین دوز اقدام به تزریق دوز یادآور کنند.

Ce contenu n'est pas destiné à remplacer les conseils ou les soins professionnels. Pour toute question, consultez toujours un professionnel de la santé ou un autre prestataire de soins qualifié.

Financial contribution from
Avec le financement de



Public Health Agency of Canada
Agence de la santé publique du Canada

Metropolis
Institute - Institut

مورد تأیید MedComm - یک باشگاه ارتباط
عمومی زیرمجموعه انجمن دانشجویان
پزشکی McGill.



مایل به کسب اطلاعات بیشتری هستید؟
(Get a booster dose" (April, 2022" •
(COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022" •



محتوی الجرعة المعززة



واکسن‌های یادآور: چرا باید واکسن یادآور را تزریق کنم؟

واکسن‌ها مانع ابتلا به نوع شدید بیماری می‌شوند اما میزان این ایمنی ممکن است به تدریج کاهش یابد. واکسن‌ها به حفظ و افزایش طول مدت زمانی ایمنی در برابر ابتلا به علائم شدید COVID-19 کمک می‌کنند.

واکسن‌های یادآور: چرا خبرهایی درباره دوز چهارم منتشر شده است؟ تا چه زمانی نیاز به تزریق واکسن است؟

واکسن‌ها همچنان موجب ایمنی قوی در برابر ابتلا به نوع شدید بیماری می‌شوند اما میزان این ایمنی با گذشت زمان به ویژه با ظهور گونه‌های جدید کاهش می‌یابد.

به همین دلیل است که تزریق دوزهای یادآور بیشتر به ویژه برای افراد آسیب‌پذیر مثل افراد مسن ضروری است.

چه علائمی از COVID-19 در دسته «علائم شدید» قرار می‌گیرند؟

علائم شدید پس از ابتلا به COVID-19 شامل ذات‌الریه شدید، نارسایی اندام‌ها و مرگ احتمالی می‌شوند.

در برخی افراد علائم COVID-19 به صورت خفیف مشاهده می‌شوند. با این حال، علائم برای همه خفیف نیستند. علائم شدید شامل این موارد می‌شوند:

- مشکل در نفس کشیدن یا تنگی نفس
- احساس فشار دائمی یا درد در قفسه سینه
- گیجی
- راحت بلند نشدن از خواب یا احساس خواب‌آلودگی
- رنگ‌پریدگی، تغییر رنگ پوست، لب‌ها یا زیر ناخن‌ها به خاکستری یا آبی.
- در صورت مشاهده این علائم در خود با 911 تماس بگیرید.

لا يُقصد بهذا المحتوى أن يكون بديلاً عن المشورة أو الرعاية المهنية. يجب دائماً السعي للحصول على خدمات أخصائيو في المجال الطبي، أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين فيما يتعلق بالأسئلة التي قد تكون لديك.

Financial contribution from
Avec le financement de



Public Health Agency of Canada
Agence de la santé publique du Canada

Metropolis
Institute - Institut

مورد تأیید MedComm - یک باشگاه ارتباط
عمومی زیرمجموعه انجمن دانشجویان
پزشکی McGill.



مایل به کسب اطلاعات بیشتری هستید؟
"Get a booster dose" (April, 2022)
"COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022)